

Concurso de Admissão – 1ª fase - Matemática

Elaborado por Caio dos Santos Guimarães (aluno do ITA)

*Escola Naval 2006*  
*Gabarito Equipe Rumoaota.com*

**Comentário:**

A prova seguiu o padrão já conhecido de alguns anos. As questões Abrangeram a maior parte dos tópicos mencionados no edital, apresentando as já tradicionais questões de cálculo e geometria analítica no  $\mathbb{R}^3$ , usuais na prova da Escola. Novamente, voltamos a criticar a banca por questões com erros de enunciado (como tem havido com muita reincidência nos últimos anos) como o da questão 13, e enunciados incompletos como o da questão 5.

O aluno bem preparado, que irá concorrer às vagas, não teve problema em obter os pontos suficientes para se classificar para a próxima fase (acreditamos que novamente fique em torno de 12 questões), mas sem dúvida teve dificuldade para gabaritar a prova.

Fica aqui então exposta a nossa sugestão para que haja uma melhor revisão por parte da banca sobre a prova, antes do dia de aplicação de prova, para que esses pequenos erros não voltem a ocorrer.

### Questão 1

Seja  $r$  a reta que contém

(i) o ponto de intersecção das retas

$$r_1 : x = 2 + 3t, y = 4 + 5t, z = 2t$$

$$r_2 : \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{4} = z+2$$

(ii) O ponto médio dos pontos  $A(1,0,-1)$  e  $B(3,-4,3)$ . As equações de  $r$  são:

a)  $x = -1 - 3t; y = -1 - t; z = -2 + 3t$

b)  $x = 1 + 3t; y = -1 - t; z = -2 + 3t$

c)  $\frac{x+1}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{3}$

e)  $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{3}$

d)  $x = 3 + 2t; y = -1 - 2t; z = 3 + t$

(i) Sabemos que a intersecção entre  $r$  e  $s$  deve pertencer a ambas as retas, logo o ponto intersecção  $P$  deve ser de ambas as formas:  $(2+3t, 4+5t, 2t)$  e  $(2k-1, 4k-1, k-2)$ .

Achando  $t$  e  $k$  para que isso seja verdade:

$$\begin{cases} 2 + 3t = 2k - 1 \\ 4 + 5t = 4k - 1 \\ 2t = k - 2 \end{cases} \quad \therefore \quad t = -1 \quad \Rightarrow \quad P = (-1, 1, 2)$$

(ii) O ponto médio de  $AB$ , denotado por  $M$  é:  $M = \frac{A+B}{2} = (2, -2, 1)$

Logo, temos um vetor diretor à reta  $r$ , que passa pelo ponto  $P=(-1,1,2)$ :

$$\overrightarrow{MP} = P - M = (3, -1, 3).$$

Logo a equação da reta é do tipo:

$$r : \frac{x+1}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{3} = \lambda \in \mathbb{R}$$

Resposta: Letra c

**Questão 2**

Sejam  $a$  e  $b$  constantes reais positivas,  $a \neq b$ . Se  $x$  é uma variável real,

então  $\int \frac{(a^x - b^x)^2}{a^x \cdot b^x} \cdot dx$  é:

a)  $(\ln a - \ln b) \cdot \left[ \left( \frac{a^x}{b^x} \right) - \left( \frac{b^x}{a^x} \right) \right] - 2x + C$

b)  $(\ln b - \ln a) \cdot \left[ \left( \frac{a^x}{b^x} \right) - \left( \frac{b^x}{a^x} \right) \right] - 2x + C$

c)  $\frac{1}{(\ln a - \ln b)} \cdot \left[ \left( \frac{a^x}{b^x} \right) - \left( \frac{b^x}{a^x} \right) \right] - 2x + C$

d)  $\left[ \left( \frac{a^x}{b^x} \right) - \left( \frac{b^x}{a^x} \right) \right] - 2x + C$

e)  $\frac{1}{(\ln b - \ln a)} \cdot \left[ \left( \frac{a^x}{b^x} \right) - \left( \frac{b^x}{a^x} \right) \right] - 2x + C$

Consideremos  $f(x) = a^x$ . Temos que:

$$\ln(f(x)) = x \cdot \ln a \Rightarrow \frac{d}{dx} \ln(f(x)) = \ln a \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = \ln a \quad \therefore f'(x) = a^x \cdot \ln a$$

Segue então que:

$$\int a^x \cdot dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C^{\text{te}} \quad (*)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int \frac{(a^x - b^x)^2}{a^x \cdot b^x} \cdot dx &= \int \frac{a^{2x} - 2a^x b^x + b^{2x}}{a^x \cdot b^x} \cdot dx = \int \left( \frac{a^x}{b^x} + \frac{b^x}{a^x} + 2 \right) \cdot dx \\ &= \int \left( \frac{a}{b} \right)^x \cdot dx + \int \left( \frac{b}{a} \right)^x \cdot dx + \int 2 \cdot dx \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{\ln(a/b)} \left( \frac{a}{b} \right)^x + \frac{1}{\ln(b/a)} \left( \frac{b}{a} \right)^x + 2x + C \\ &= \frac{1}{\ln a - \ln b} \left( \frac{a}{b} \right)^x - \frac{1}{\ln a - \ln b} \left( \frac{b}{a} \right)^x + 2x + C = \frac{1}{\ln a - \ln b} \left[ \left( \frac{a}{b} \right)^x - \left( \frac{b}{a} \right)^x \right] + 2x + C \end{aligned}$$

**Resposta: Letra c**

### Questão 3

Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -i & 0 \\ 1 & -1 & -i \\ i^3 & 1 & -i \end{pmatrix}$$

com os elementos em  $\mathbb{C}$ . Sendo  $z, z_1 \in \mathbb{C}$ , e  $z = \det(A)$ , então a forma trigonométrica de  $z_1 = z - \frac{1}{z} + \frac{\bar{z}}{2}$  é:

b)  $\sqrt{2} \cdot \text{cis}\left(\frac{5\pi}{4}\right)$    b)  $\sqrt{2} \cdot \text{cis}\left(\frac{7\pi}{4}\right)$    c)  $2 \cdot \text{cis}\left(\frac{\pi}{2}\right)$    d)  $2 \cdot \text{cis}\left(\frac{3\pi}{2}\right)$    e) 1

$$z = \det(A) = -i + i^5 - i - i^2 = 1 - i$$

$$\begin{aligned} z_1 &= z - \frac{1}{z} + \frac{\bar{z}}{2} = (1 - i) - \frac{1}{1 - i} + \frac{(1 + i)}{2} \\ &= (1 - i) - \frac{(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} + \frac{(1 + i)}{2} \\ &= (1 - i) - \frac{1 + i}{2} + \frac{1 + i}{2} \\ &= 1 - i \\ &= \sqrt{2} \cdot \left( \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \sqrt{2} \cdot \text{cis}\left(\frac{7\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

**Resposta: Letra b**

### Questão 4

O conjunto de todos os valores de  $\theta \in [0, \pi]$  que satisfazem o sistema

i)  $x^2 + x + \operatorname{tg}\theta > \frac{3}{4} \quad \forall x \in \mathbb{R}$       é:

ii)  $\frac{1}{\ln\theta} + \frac{1}{1-\ln\theta} > 1$

- a)  $]1, \pi[$     b)  $\left] \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right[$     c)  $\left] 1, \frac{\pi}{2} \right[$     d)  $\left] \frac{\pi}{2}, e \right[$     e)  $]e, \pi[$

De (i) temos que  $x^2 + x + \left(\operatorname{tg}\theta - \frac{3}{4}\right) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ . Como essa função do 2º grau tem concavidade para cima ela não pode ter raiz para que isso aconteça. Logo, o seu determinante deve ser menor que 0.

$$\Delta = 1 - 4 \left( \operatorname{tg}\theta - \frac{3}{4} \right) < 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg}\theta > 1 \quad \therefore \frac{\pi}{4} < \theta < 2 \quad (*)$$

De (ii)

$$\begin{aligned} \frac{1}{\ln\theta} + \frac{1}{1-\ln\theta} > 1 &\Rightarrow \frac{1}{(\ln\theta)(1-\ln\theta)} > 1 \\ &\Rightarrow \frac{1}{(\ln\theta)(1-\ln\theta)} - 1 > 0 \Rightarrow \frac{1 - \ln\theta + \ln^2\theta}{(\ln\theta)(1-\ln\theta)} > 0 \end{aligned}$$

O numerador é sempre positivo uma vez que possui determinante negativo para todo  $\ln\theta$  real (ou seja para todo  $\theta$  real). Analisemos o denominador. Como  $\ln\theta$  e  $1 - \ln\theta$  não podem ser simultaneamente negativos temos que:

$$\ln\theta > 0 \quad \text{e} \quad 1 - \ln\theta > 0 \Rightarrow 0 < \ln\theta < 1 \quad \therefore 1 < \theta < e \quad (**)$$


Da interseção entre (\*) e (\*\*):  $1 < \theta < \frac{\pi}{2}$

Resposta: Letra c

Questão 5

Um tapete de 8 faixas deve ser pintado com cores azul, preta e branca. A quantidade de maneiras que podemos pintar esse tapete de modo que as faixas consecutivas não sejam da mesma cor é:

- a) 256 b) 384 c) 520 d) 6561 e) 8574



A primeira faixa tem 3 opções de cor : azul, preta e branca.

A segunda faixa tem 2 opções de cor: as 2 restantes excluindo a já escolhida.

O mesmo acontece para a 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, ..., 8<sup>a</sup> faixa.

Logo pelo princípio multiplicativo temos que o numero de maneiras de pintar o tapete é:

$$3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 384$$

Resposta: Letra b

OBS: O enunciado poderia ter sido mais claro quanto como são dispostas essas faixas. Supomos para a nossa resolução que a disposição é feita como na nossa figura.

Questão 6

O gráfico que melhor representa a função


$$f(x) = \begin{cases} |\ln x| & \text{se } 0 < x \leq e \\ -x + 1 + e & \text{se } x > e \\ \ln|x| & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

OBS: Deixamos de lado as opções por comodidade

i)  $|\ln x|$  equivale ao gráfico de  $\ln x$  acima do eixo das abcissas adicionado ao “espelho” do gráfico de  $\ln x$  abaixo do eixo das abcissas. Notar que  $\ln x$  está abaixo do eixo das abcissas em  $0 < x < 1$  e acima em  $1 < x < e$  (Estamos analisando apenas o primeiro intervalo)

ii)  $-x + 1 + e$  é uma reta que passa pelo ponto  $(e, 1)$  e  $(1+e, 0)$

iii)  $\ln|x|$  equivale ao gráfico espelhado de  $\ln x$  em relação ao eixo das ordenadas. Isso se deve ao fato de que para cada valor negativo de  $x$ ,  $|x|$  associa o seu valor absoluto (o valor simétrico de  $x$  em relação ao eixo  $y$  para  $x$  negativo) que associará no eixo das ordenadas o valor do logaritmo natural desse valor absoluto.



### Questão 7

Um tanque de combustível tem a forma de um cilindro circular reto e a sua altura mede 3 metros. O raio da base do cilindro vale, em metros, o dobro da soma dos cubos dos inversos das raízes da equação  $x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 8x + 4 = 0$ . A área lateral do tanque em  $m^2$ , mede:

- a)  $6\pi$    b)  $12\pi$    c)  $18\pi$    d)  $36\pi$    e)  $48\pi$

Sejam  $a, b, c, d$  as raízes da equação do 4º grau.

Denotemos por  $S_k$  as somas de Girard e  $S_k^* = a^k + b^k + c^k + d^k$  as somas de Newton.

Queremos achar:  $2\left(\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} + \frac{1}{d^3}\right) = 2.S_{-3}^*$

- $S_{-2}^* = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (a + b + c + d)^2 - 2(ab + ac + ad + bc + bd + cd)$   
 $= S_1^2 - 2.S_2 = (-4)^2 - 2.8 = 0$
- $S_1^* = a + b + c + d = S_1 = -4$
- $S_0^* = a^0 + b^0 + c^0 + d^0 = 4$
- $S_{-1}^* = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}\right) = \left(\frac{bcd + acd + abd + abc}{abcd}\right) = \frac{S_3}{S_4} = \frac{-8}{4} = -2$

Do teorema de Newton:

- $S_2^* + 4S_1^* + 8S_0^* + 8S_{-1}^* + 4S_{-2}^* = 0 \Rightarrow 0 - 16 + 32 - 16 + 4.S_{-2}^* = 0 \Rightarrow S_{-2}^* = 0$
- $S_1^* + 4S_0^* + 8S_{-1}^* + 8S_{-2}^* + 4S_{-3}^* = 0 \Rightarrow -4 + 16 - 16 + 0 + 4S_{-3}^* = 0 \Rightarrow S_{-3}^* = 1$

Logo o raio da base vale 2

A área lateral é  $2\pi rh = 2.\pi.2.3 = 12\pi$

Resposta: letra b



**Questão 8**

Seja  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -4 & 5 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$  e  $D = (d_{ij})_{3 \times 3} = B^2 - 4B + 3I$ .

Se o número real  $N = \sum_{i=1}^3 (d_{ii})$  é o produto escalar dos vetores

$\vec{u} = (2, 11, 1)$  e  $\vec{v} = (5, a, 4)$ , então o valor de  $\text{tg}2\theta$ , onde  $\theta$  é o ângulo formado entre os vetores  $u$  e  $w$  vale:

a)  $-\frac{\sqrt{6}}{19}$     b)  $\frac{12\sqrt{3}}{7}$     c)  $-\frac{17\sqrt{3}}{20}$     d)  $-\frac{12\sqrt{6}}{19}$     e)  $\frac{12\sqrt{7}}{20}$

$$D = B^2 - 4B + 3I = (B - I) \cdot (B + 3I)$$

Os valores dos elementos da diagonal principal de  $D$  pelo produto de matrizes serão:  $d_{11} = 6$ ,  $d_{22} = 36$ ,  $d_{33} = -6$ .

Logo:  $N = 36 = (2, 11, 1) \cdot (5, a, 4) = 10 + 11a + 4 \quad \therefore a = 2$

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{w} &= \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{w}\| \cdot \cos \theta \Rightarrow 36 = \sqrt{2^2 + 11^2 + 1} \cdot \sqrt{5^2 + 2^2 + 4^2} \cdot \cos \theta \\ &\Rightarrow \cos \theta = \frac{4}{\sqrt{70}} \Rightarrow \sin \theta = \sqrt{1 - \frac{16}{70}} = \frac{\sqrt{54}}{\sqrt{70}} \\ &\Rightarrow \text{tg} \theta = \frac{\sqrt{54}}{4} = \frac{3\sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

Com isso:  $\text{tg}2\theta = \frac{2\text{tg}\theta}{1 - \text{tg}^2\theta} = \frac{3\sqrt{6}/2}{1 - (9 \cdot 6)/16} = \frac{12\sqrt{6}}{19}$

**Resposta: Letra d**

**Questão 9**

A reta  $r$  tangente à curva de equação  $x - \sqrt{xy} + y = 1$  no ponto  $P=(x,y)$  é paralela ao eixo das abscissas. Pode-se afirmar que o ponto  $P$  também pertence à reta de equação:

- a)  $x = 0$    b)  $y = 1$    c)  $y - x + 2 = 0$    d)  $y - x - 1 = 0$    e)  $3y + 3x - 1 = 0$

$$x - \sqrt{xy} + y = 1$$

Derivando implicitamente com relação a  $x$  dos dois lados, temos:

$$1 - \frac{1}{\sqrt{xy}} \cdot (y + x \cdot y') + y' = 0 \quad (*)$$

No ponto dado, o coeficiente angular de  $r$  é 0 (paralela ao eixo das abscissas), logo  $y' = 0$ .

$$1 - \frac{1}{\sqrt{xy}} \cdot (y + x \cdot 0) + 0 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{y}{\sqrt{xy}} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{y^2}{4} = xy$$

$P$  deve pertencer à curva.

Temos de (\*), que  $y$  é diferente de 0, temos:  $y = 4x$ , e:

$$x - \sqrt{4x^2} + 4x = 1 \quad \Rightarrow \quad 5x - |2x| = 1 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \text{Se } x \geq 0 \Rightarrow x = 1/3 \\ \text{Se } x < 0 \Rightarrow 7x = 1 \end{cases}$$

Como a segunda possibilidade não convém, uma vez que  $y=4x$ ,

temos:  $P = \left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$  que pertence à reta  $y - x = 1$

**Resposta: Letra d**

OBS: Não é dado no problema que  $y$  é diferente de 0, mas uma vez que não é possível explicitar essa equação de curva de forma simples (pelo menos nos objetivos da prova) concluímos que a banca quisesse que o candidato usasse derivada implícita (e nesse caso seria necessário mencionar que  $y$  é diferente de 0).

**Questão 10**

As raízes  $a, b, c$  da equação  $x^3+mx^2-6x+8=0$ ,  $m$  real, representam os 3 primeiros termos de uma progressão aritmética crescente.

Se  $\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ac} = -\frac{3}{8}$ , o valor do 17º termo da PA vale:

- a) 38   b) 41   c) 46   d) 51   e) 57

$a, b, c$  estão em PA, então  $a = b-r, c = b+r, r>0$  (PA crescente)

A soma das 3 raízes, por Girard vale  $-m$ .

Logo:  $m = -(b-r + b + b+r) = -3b$

$$\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ac} = \frac{c+a+b}{abc} = \frac{S_1}{S_3} = \frac{-m}{-8} = -\frac{3}{8} \quad \therefore m = -3 \quad \therefore b = 1$$

Logo 1 é raiz. Fatorando (algoritmo de Briot-Ruffini) chegamos a:

$$x^3 - 3x^2 - 6x + 8 = (x-1).(x^2 - 2x - 8) = (x-1)(x+2)(x-4)$$

Logo as raízes são -2, 1, 4 e com isso  $r=3$

A PA tem termo geral:  $a_n = a_1 + (n-1).r$

Segue então que:


$$a_{17} = -2 + (16).3 = 46$$

Resposta: Letra c

**Questão**

Na figura abaixo o triângulo PMR é equilátero e o quadrilátero PQRS é um quadrado cujo lado mede 2 cm. A área do triângulo MNR, em cm<sup>2</sup>, vale:

- a) 1   b)  $\sqrt{2}$    c)  $\sqrt{3}$    d)  $\sqrt{6}$    e)  $\sqrt{12}$



i)  $\overline{MR} = \overline{PR} = 2\sqrt{2}$  (diagonal do quadrado)

ii)  $\sphericalangle QRP = 45^\circ$  (pois # PQRS é quadrado)  
 $\sphericalangle PRM = 60^\circ$  (pois  $\triangle PRM$  é equilátero)

Logo o ângulo  $\sphericalangle NRM$  vale  $180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$   
 ..

**Temos então que:**

$$\overline{MN} = \overline{MR} \cdot \text{sen} 75^\circ$$

$$\overline{RN} = \overline{MR} \cdot \text{cos} 75^\circ$$

**A área hachurada vale :**

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{(\overline{MR} \cdot \text{cos} 75^\circ) \cdot (\overline{MR} \cdot \text{sen} 75^\circ)}{2} = \frac{\overline{MR}^2 \cdot (2 \text{sen} 75^\circ \cdot \text{cos} 75^\circ)}{4} \\
 &= \frac{\overline{MR}^2 \cdot (\text{sen}(180^\circ - 30^\circ))}{4} = \frac{8 \cdot (\text{sen}(30^\circ))}{4} = 1
 \end{aligned}$$

Resposta: Letra a

**Questão 13 - ANULADA**

Sejam  $r$  e  $s$  retas do plano tais que:

i)  $r$  possui coeficiente angular positivo e não intercepta a curva de

equação 
$$\frac{(x-2)^2}{9} - \frac{(y-1)^2}{4} = 1 .$$

ii)  $s$  é tangente ao gráfico da função real  $f$  definida por:

$f(x)e^{x^2-1} \cdot \sqrt{3x-2} + \ln[1+(x-1)^4]$  no ponto  $P(1,1)$ .

Se  $I$  é o ponto de interseção de  $r$  e  $s$  então a soma de suas coordenadas vale:

- a)  $\frac{4}{25}$    b)  $\frac{11}{17}$    c)  $\frac{12}{25}$    d)  $\frac{21}{25}$    e)  $\frac{16}{17}$

A questão tem enunciado INCORRETO e portanto deverá ser ANULADA. Repare que a primeira informação diz que  $r$  possui coeficiente angular positivo e não intercepta a hipérbole de equação dada. Fazendo o gráfico percebemos facilmente que existem infinitas retas que atendem à essa condição, ou seja, o problema tem infinitas respostas. A primeira informação deveria ser reformulada da seguinte forma:

(i)"  $r$  é a assíntota de coeficiente angular positivo da hipérbole de equação..."

Faremos a seguir um gabarito para essa questão reformulada.

A assíntota de coeficiente angular positivo será:

$$(y-1) = \frac{2}{3}(x-2) \Rightarrow 3y-3 = 2x-4 \Rightarrow 3y = 2x-1 \quad (r)$$

$$\text{ii) } f'(x) = (2x) \cdot e^{x^2-1} \cdot \sqrt{3x-2} + e^{x^2-1} \cdot \frac{3}{2\sqrt{3x-2}} + \frac{4 \cdot (x-1)^3}{1+(x-1)^4} \therefore f'(1) = \frac{7}{2}$$

Logo a reta tangente em  $(1,1)$  tem coeficiente angular  $7/2$ . Sua equação será:

$$(y-1) = \frac{7}{2} \cdot (x-1) \Rightarrow 2y = 7x-5 \quad (s)$$

A interseção entre  $r$  e  $s$  virá do

$$\text{sistema: } \begin{cases} 3y = 2x-1 \\ 2y = 7x-5 \end{cases} \therefore x = \frac{13}{17}, y = \frac{3}{17}$$

Portanto a soma das coordenadas é:  $\frac{16}{17}$

Resposta: Letra e

**Questão 14**

O domínio da função real  $f$  de variável real, definida por:

$$f(x) = \frac{\text{Arcsen}\left(\log\left(\frac{x}{10}\right)\right)}{\sqrt[4]{9x-x^3}} \quad \text{é:}$$

- a)  $[1,100]$    b)  $]0,3[ \cup (3,100]$    c)  $]1,3[ \cup (3,100]$   
 d)  $(0,100]$    e)  $[1,3)$

A função  $\arcsen x$  tem domínio restrito entre -1 e 1.

Logo:

$$\Rightarrow -1 \leq \log\left(\frac{x}{10}\right) \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{10} \leq \left(\frac{x}{10}\right) \leq 10 \quad (*)$$

$$\Rightarrow 1 \leq x \leq 100$$

Para que  $f$  esteja definida, analisando o denominador:

$$9x - x^3 > 0 \Leftrightarrow x(3-x)(3+x) > 0$$

Para  $x < -3$ :  $x < 0$ ,  $3-x > 0$ ,  $3+x > 0$  Logo  $9x-x^3 < 0$  (não convém)

Para  $-3 < x < 0$ :  $x < 0$ ,  $3-x > 0$ ,  $(3+x) > 0$ . Logo  $9x-x^3 < 0$  (não convém)

Para  $0 < x < 3$ :  $x > 0$ ,  $3-x > 0$ ,  $3+x > 0$ . Logo  $9x-x^3 > 0$  (convém)

Para  $3 < x$ :  $x > 0$ ,  $3-x < 0$ ,  $3+x > 0$ . Logo  $9x-x^3 < 0$  (não convém)

Logo, para a existência de  $f$ , devemos ter:  $0 < x < 3$  (\*)

Da interseção entre (\*) e (\*\*):  $0 < x < 3$

Resposta: Letra e


**Questão 15**

A região R do plano, limitada pela curva de equação  $x = \sqrt{2y - y^2}$  Com y em [0,1], e pelas retas  $2y - 3x + 1 = 0$  e  $3y - 2x - 6 = 0$ , gira em torno da reta  $y=1$  gerando um sólido S. O volume de S em unidades de volume é:

- é:
- a)  $\frac{19\pi}{3}$     b)  $\frac{17\pi}{3}$     c)  $3\pi$     d)  $\frac{15\pi}{6}$     e)  $\frac{11\pi}{6}$

$$x = \sqrt{2y - y^2} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 2y = 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + (y - 1)^2 = 1 \\ x \geq 0 \end{cases} \quad \text{que representa}$$

um quadrante de circunferência (pois y é maior ou igual a 1). Traçando-se os gráficos das retas chegamos à seguinte ilustração:



Interseção das retas:  $\begin{cases} 2y - 3x + 1 = 0 \\ 3y - 2x - 6 = 0 \end{cases} \therefore (x, y) = (3, 4)$

O volume gerado pela revolução é um tronco de cone (raio menor igual a 1 e raio maior igual a 3) subtraído de uma semi-esfera (raio 1) e de um cone menor (raio da base igual a 3).

$$V = V_{\text{tronco}} - V_{\text{semi-esfera}} - V_{\text{cone}} = \frac{\pi h}{3}(R^2 + r^2 + Rr) - \frac{2\pi r^3}{3} - \frac{\pi r^2 \cdot (h')}{3}$$

$$= \frac{\pi \cdot 3}{3}(9 + 1 + 3) - \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot (2)}{3} = \frac{19\pi}{3}$$

Resposta: Letra a

**Questão 16**

Considere a matriz  $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$  tal que  $a_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \frac{2i+j}{3}$ . Seja

$D = 2A - A^t$ . Sabendo que:

$d_{12} = -x - b - 2c$ ,  $d_{23} = x - 3b + c$ ,  $d_{31} = x + 4b + 2c$ , onde  $x, b, c$  pertencem

aos reais,  $b$  diferente de  $x$ , então o valor de  $\frac{c}{b-x}$  é:

a)  $\frac{1}{4}$  b)  $\frac{1}{3}$  c) 1 d)  $\frac{3}{2}$  e)  $\frac{5}{2}$

$$2A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ -5 & 6 & -7 \\ 7 & -8 & 9 \end{pmatrix} \text{ e } A^t = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} & \frac{7}{2} \\ -2 & 3 & -4 \\ \frac{5}{2} & -\frac{7}{2} & \frac{9}{2} \end{pmatrix}$$

Logo:

$$D = 2A - A^t = A^t = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ -3 & 3 & -3 \\ \frac{9}{2} & -\frac{9}{2} & \frac{9}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{Logo } \begin{cases} -x - b - 2c = -\frac{3}{2} \\ x - 3b + c = -3 \\ x + 4b + 2c = \frac{9}{2} \end{cases} \therefore b = 1, c = \frac{1}{2}, x = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Com isso: } \frac{c}{b-x} = \frac{\frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

**Resposta: Letra b**



**Questão 17**

**Calcule:**

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln x) \cdot (\ln(x-1))$$

- a)  $+\infty$  b) e c) 1 d) 0 e)  $-1$

**Seja L o limite pedido:**

$\lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln x) \cdot (\ln(x-1))$  dá uma indeterminação do tipo:  $0 \cdot (-\infty)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln x) \cdot (\ln(x-1)) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\overbrace{(\ln(x-1))}^f}{\underbrace{1/(\ln x)}_g} \text{ dá indeterminação do tipo: } \frac{-\infty}{\infty}$$

**Calculemos:**

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f'}{g'} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{(x-1)}}{-\frac{1}{x(\ln x)^2}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x \cdot (\ln x)^2}{(x-1)} \text{ que dá indeterminação: } \frac{0}{0}$$

**Calculemos:**

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f''}{g''} = \lim_{x \rightarrow 1^+} [(\ln x)^2 + 2 \ln x] = 0$$

**Logo pelo teorema de L'Hospital:**

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f'}{g'} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f''}{g''} = 0$$

**Resposta: Letra d**

**Questão 18**

No universo  $U=\mathbb{R}^+$ , o conjunto solução da inequação  $x^{2x^2-9x+4} < 1$  é:

- a)  $\left[0, \frac{1}{2}\right) \cup (1, 4)$
- b)  $\left(\frac{1}{2}, 1\right) \cup (4, +\infty)$
- c)  $\left(\frac{1}{2}, 1\right) \cup \{0\}$
- d)  $\left(\frac{1}{2}, 4\right) \cup \{0\}$
- e)  $[0, 1) \cup (1, 4)$

$$x^{2x^2-9x+4} < x^0$$

$x=1$  não é solução, pois obtemos a igualdade  $1=1$

i) Se  $0 \leq x < 1$ :

$$2x^2 - 9x + 4 > 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{2} \text{ ou } x > 4$$

Mas  $x$  está entre 0 e 1, logo:  $0 \leq x < \frac{1}{2}$

ii) Se  $x > 1$ :

$$2x^2 - 9x + 4 < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x < 4$$

Mas  $x$  deve ser maior que 1, logo:  $1 < x < 4$

Logo, de (i) e (ii):  $1 < x < 4$  ou  $0 \leq x < \frac{1}{2}$

Resposta: Letra a

**Questão 19**

Seja  $b$  a menor das abscissas dos pontos de interseção das curvas definidas pelas funções reais de variável real:  $f(x) = x^5 - \ln(2x)$  e  $g(x) = x^5 - \ln^2(2x)$ . O produto de raízes da equação:

$$\frac{x^{\log_5(x)^{1/5}}}{(2 + \log_2 b)^{1/5}} = 5 \text{ é:}$$

- a) -1 b) -1/5 c) 1/5 d) 3/5 e) 1

Achemos a interseção de  $f$  e  $g$ :

$$x^5 - (\ln 2x) = x^5 - \ln^2(2x) \Leftrightarrow \ln(2x) \cdot (\ln(2x) - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \ln 2x = 0 \\ \ln 2x = 1 \end{cases}$$

Que geram os pontos:  $x=1/2$  e  $x=e/2$  (sendo o primeiro desses o de menor abscissa), ou seja  $b=1/2$ .

Com isso:

$$\frac{x^{\log_5 x^{1/5}}}{2 + \log_2 b} = 5 \Leftrightarrow x^{\left(\frac{1}{25}\right) \cdot \log_5 x} = 5$$

Aplicando  $\log_5$  dos dois lados:

$$\left(\frac{1}{25}\right) \cdot \log_5 x \cdot \log_5 x = 1 \Leftrightarrow \log_5 x = \pm 5 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 25 \\ x_2 = \frac{1}{25} \end{cases}$$

O produto das raízes dá, então, 1.

**Resposta: Letra e**

**Questão 20**

O cone circular reto, de volume mínimo, circunscrito a um hemisfério de raio R e apoiado no plano diametral, tem por volume real:

- a)  $\frac{\pi R^3}{3}$     b)  $\frac{\sqrt{3}\pi R^3}{3}$     c)  $\pi R^3$     d)  $\frac{\sqrt{2}\pi R^3}{3}$     e)  $\frac{\sqrt{3}R^3}{2}$


$$\Delta TOH: \frac{R}{h} = \cos x \Rightarrow h = R \cdot \sec x$$

$$\Delta TBO: \frac{R}{\overline{OB}} = \sin x \Rightarrow \overline{OB} = R \cdot \csc x$$

Logo, o volume do cone é:

$$V(x) = \frac{\pi}{3} \cdot R^2 \cdot \csc^2 x \cdot R \cdot \sec x$$

$$= \frac{\pi}{3} \cdot R^3 \cdot \sec x \cdot \csc^2 x.$$



Derivando em relação a x:

$$V'(x) = \frac{\pi R^3}{3} \cdot (\csc^2 x \cdot \sec x \cdot \operatorname{tg} x - \sec x \cdot 2 \csc x \cdot \csc x \cdot \operatorname{ctg} x)$$

$$= \frac{\pi R^3}{3} \cdot \left( \frac{1}{\operatorname{sen} x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{2}{\operatorname{sen}^3 x} \right)$$

$$= \frac{\pi R^3}{3} \cdot \left( \frac{1}{\operatorname{sen} x} \cdot \left( \frac{1}{\cos^2 x} - \frac{2}{\operatorname{sen}^2 x} \right) \right)$$

$$= \frac{\pi R^3}{3} \cdot \left( \frac{1}{\operatorname{sen} x} \cdot \left( \frac{\operatorname{sen}^2 x - 2 \cos^2 x}{\cos^2 x \cdot \operatorname{sen}^2 x} \right) \right)$$

Logo

$$V'(x) = 0 \Leftrightarrow \sin^2 x = 2 \cos^2 x \Leftrightarrow \operatorname{tg}^2 x = 2 \Leftrightarrow \operatorname{tg} x = \sqrt{2} \Leftrightarrow x = \operatorname{Arctg}(\sqrt{2})$$

$$\begin{cases} V'(x) > 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg}^2 x > 2 \\ V'(x) < 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg}^2 x < 2 \end{cases}$$

V decresce antes de  $\operatorname{Arctg}(\sqrt{2})$  e cresce depois. Logo o ponto analisado é um ponto de mínimo. Não é difícil notar que esse ponto é um mínimo global.

$$\operatorname{csc}^2 x = \operatorname{ctg}^2 x + 1 = \frac{3}{2} \Rightarrow \operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \Rightarrow \operatorname{cos} x = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \operatorname{sec} x = \sqrt{3}$$

Com isso:

$$V_{\min} = \frac{\pi R^3}{3} \cdot \operatorname{sec} x \cdot \operatorname{csc}^2 x = \frac{\pi R^3}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\pi R^3}{2} \cdot \sqrt{3}$$

Resposta: Letra e